



التعرف على عملية كحت بطانة عنق الرحم

كحت بطانة عنق الرحم (endocervical curettage, ECC) هو إجراء يتم إجراؤه في بعض الأحيان بعد الحصول على نتائج غير طبيعية في اختبار مسحة عنق الرحم (اختبار فحص سرطان عنق الرحم). يتم إدخال أداة تسمى المكحلة إلى عنق الرحم لجمع عينة رقيقة من الأنسجة من بطانة قناة عنق الرحم، والتي تسمى أيضًا قناة عنق الرحم. يتم إرسال عينة الأنسجة إلى المختبر لفحصها تحت المجهر بحثًا عن أي علامة تشير إلى وجود مرض.

كيفية الاستعداد

يجب عليك إخبار طبيبك:

- ◀ إذا كنت حاملاً أو تعتقد أنك قد تكونين حاملاً
 - ◀ إذا كنت تعاني من أي اضطرابات نزيف و/أو إذا كنت تتناولين مضادات التخثر أو الأسبرين أو أي دواء آخر يؤثر على تخثر الدم
 - ◀ إذا كان لديك أي حساسية
 - ◀ إذا كنت تتلقين أي أدوية، سواء كانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية
- تجنبي ممارسة الجنس، واستخدام السدادات القطنية، والكريمات أو الأدوية المهبلية، والدوش المهبلي لمدة 24 ساعة قبل العملية إذا كان ذلك ممكناً.
- يمكنك تناول مسكن للألم متاح دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين (ibuprofen) أو تايلينول (Tylenol)، قبل موعدك بنحو 30 دقيقة للمساعدة في التغلب على أي تقلصات خفيفة قد تشعرين بها بعد ذلك.

كيف يُجرى الإجراء

سيتم إدخال أداة على شكل منقار البط، تسمى المنظار، في المهبل حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية من رؤية عنق الرحم. سيتم تنظيف المنطقة إما بمحلول الخل أو اليود. يمكن استخدام أداة للمساعدة في رؤية عنق الرحم بشكل أفضل أو تثبيته في مكانه. سيتم بعد ذلك إدخال المكحلة داخل عنق الرحم لكشط طبقة رقيقة من الأنسجة من داخل قناة عنق الرحم. قد تشعرين بوخز و/أو بعض التقلصات الخفيفة.

ما ينبغي توقعه بعدها

قد تصابين ببعض التقيح أو النزف الخفيف نتيجة لهذا الإجراء. قد تصابين ببعض الإفرازات المهبلية غير الطبيعية بسبب المحلول المستخدم لتنظيف عنق الرحم أو إذا تم وضع دواء على عنق الرحم لوقف أي نزيف. ستحصلين على فوط صحية لارتدائها في المنزل بعد العملية. لا تقومي بإدخال أي شيء في المهبل ولا تمارسي الجنس لمدة 48 ساعة على الأقل أو طالما كنت تعاني من أي تقيح أو إفرازات.

متى يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اذهبي إلى قسم الطوارئ إذا كان لديك أي مما يلي:

- نزيف حاد، مثل نفع فوطة ماكسي (maxi) خلال ساعة أو أقل لمدة ساعتين أو أكثر.
- ألم الحوض أو ألم شديد في البطن
- حمى تزيد عن 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)
- إفرازات ذات رائحة كريهة

هذه النشرة للأغراض المعلوماتية فقط. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي أسئلة حول رعايتك.

لمزيد من المعلومات الصحية، تفضلي بزيارة wexnermedical.osu.edu/patiented أو اتصل بمكتبة المعلومات الصحية على الرقم 614-293-3707 أو health-info@osu.edu.

Endocervical Curettage



THE OHIO STATE
UNIVERSITY

WEXNER MEDICAL CENTER

Learning about endocervical curettage

An endocervical curettage (ECC) is a procedure sometimes done after having abnormal results on a Pap Smear (cervical cancer screening test). An instrument, called a curette, is inserted into the cervix to collect a thin sample of tissue from the lining of the cervical canal, also called the endocervical canal. The tissue sample is sent to a lab to be checked under a microscope for any sign of disease.

How to prepare

- You should inform your doctor:
 - If you are pregnant, or think you may be pregnant
 - If you have any bleeding disorders and/or if you take anticoagulants, aspirin, or other medicine that affects blood clotting
 - If you have any allergies
 - If you take any medicines, either prescribed or over-the-counter
- Avoid having sex, using tampons, vaginal creams or medicines, and douching for 24 hours before the procedure if possible.
- You may take an over-the-counter pain reliever, such as ibuprofen or Tylenol, about 30 minutes before your appointment to help with any mild cramping you may have after.

How the procedure is done

- A duck-bill shaped tool, called a speculum will be inserted into the vagina so the provider can see your cervix.
- The area will be cleaned with either a vinegar or iodine solution.
- An instrument may be used to help see the cervix better or to hold it in place.
- The curettage will then be inserted inside the cervix to scrape a thin layer of tissue from inside the cervical canal.
- You may have a pinching feeling and/or some mild cramping.

What to expect after

- You may have some spotting or light bleeding from the procedure.
- You may have some abnormal vaginal discharge from the solution used to clean your cervix or if a medicine was applied to the cervix to stop any bleeding.
- You will be given a pad to wear home after the procedure.
- Do not insert anything in the vagina and do not have sex for at least 48 hours or for as long as you are having any spotting or discharge.

When to call your healthcare provider

Call your provider or go to the emergency department if you have any of the following:

- Heavy bleeding, such as soaking a maxi pad in an hour or less for 2 or more hours.
- Pelvic pain or severe pain in your abdomen
- Fever over 100 degrees F (38 degrees C)
- Foul-smelling discharge

This handout is for informational purposes only. Talk to your healthcare provider if you have any questions about your care.

For more health information, go to wexnermedical.osu.edu/patiented or contact the Library for Health Information at 614-293-3707 or health-info@osu.edu.