

Legrado endocervical



THE OHIO STATE
UNIVERSITY

WEXNER MEDICAL CENTER

Información sobre el legrado endocervical

El legrado endocervical (ECC) es un procedimiento que a veces se hace después de obtener resultados anormales en una prueba de Papanicolaou (prueba de detección de cáncer de cuello uterino). Se inserta un instrumento, llamado cureta, en el cuello uterino para recolectar una muestra delgada de tejido del revestimiento del conducto cervical, también llamado conducto endocervical. La muestra de tejido se envía a un laboratorio para examinarla al microscopio para detectar cualquier señal de enfermedad.

Cómo prepararse

- Debe informar a su médico:
 - Si está embarazada o cree que puede estarlo
 - Si tiene algún trastorno hemorrágico o si toma anticoagulantes, aspirin u otros medicamentos que afecten la coagulación sanguínea
 - Si tiene alguna alergia
 - Si toma algún medicamento, ya sea recetado o de venta libre
- Evite tener relaciones sexuales, usar tampones, cremas o medicamentos vaginales y duchas vaginales por 24 horas antes del procedimiento, si es posible.
- Puede tomar un analgésico de venta libre, como ibuprofen o Tylenol, unos 30 minutos antes de su cita para aliviar cualquier calambre leve que pueda tener después.

Cómo se realiza el procedimiento

- Se insertará en la vagina un instrumento con forma de pico de pato, llamado espéculo, para que el proveedor pueda ver el cuello uterino.
- El área se limpiará con una solución de vinagre o yodo.
- Se puede usar un instrumento para ayudar a ver mejor el cuello uterino o para mantenerlo en su lugar.
- Luego se insertará la cureta dentro del cuello uterino para raspar una fina capa de tejido del interior del conducto cervical.
- Es posible que sienta una sensación de pinchazo o algunos calambres leves.

¿Qué esperar después?

- Es posible que tenga algo de manchado o sangrado leve durante el procedimiento.
- Es posible que tenga algún flujo vaginal anormal debido a la solución usada para limpiar el cuello uterino o si se aplicó un medicamento en el cuello uterino para detener cualquier sangrado.
- Le darán una toalla sanitaria para que la use en casa después del procedimiento.
- No inserte nada en la vagina y no tenga relaciones sexuales durante al menos 48 horas o siempre que tenga manchado o flujo.

¿Cuándo debe llamar a su proveedor de atención médica?

Llame a su proveedor o acuda al departamento de emergencias si tiene alguno de los siguientes:

- Sangrado abundante, como empapar una toalla sanitaria en una hora o menos por 2 horas o más.
- Dolor pélvico o dolor intenso en el abdomen
- Fiebre superior a 100 grados F (38 grados C)
- Flujo con mal olor

Este folleto es solo para fines informativos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre su atención.

Para obtener más información médica, visite wexnermedical.osu.edu/patiented o comuníquese con la Biblioteca de Información Médica al 614-293-3707 o health-info@osu.edu.

Endocervical Curettage



THE OHIO STATE
UNIVERSITY

WEXNER MEDICAL CENTER

Learning about endocervical curettage

An endocervical curettage (ECC) is a procedure sometimes done after having abnormal results on a Pap Smear (cervical cancer screening test). An instrument, called a curette, is inserted into the cervix to collect a thin sample of tissue from the lining of the cervical canal, also called the endocervical canal. The tissue sample is sent to a lab to be checked under a microscope for any sign of disease.

How to prepare

- You should inform your doctor:
 - If you are pregnant, or think you may be pregnant
 - If you have any bleeding disorders and/or if you take anticoagulants, aspirin, or other medicine that affects blood clotting
 - If you have any allergies
 - If you take any medicines, either prescribed or over-the-counter
- Avoid having sex, using tampons, vaginal creams or medicines, and douching for 24 hours before the procedure if possible.
- You may take an over-the-counter pain reliever, such as ibuprofen or Tylenol, about 30 minutes before your appointment to help with any mild cramping you may have after.

How the procedure is done

- A duck-bill shaped tool, called a speculum will be inserted into the vagina so the provider can see your cervix.
- The area will be cleaned with either a vinegar or iodine solution.
- An instrument may be used to help see the cervix better or to hold it in place.
- The curettage will then be inserted inside the cervix to scrape a thin layer of tissue from inside the cervical canal.
- You may have a pinching feeling and/or some mild cramping.

What to expect after

- You may have some spotting or light bleeding from the procedure.
- You may have some abnormal vaginal discharge from the solution used to clean your cervix or if a medicine was applied to the cervix to stop any bleeding.
- You will be given a pad to wear home after the procedure.
- Do not insert anything in the vagina and do not have sex for at least 48 hours or for as long as you are having any spotting or discharge.

When to call your healthcare provider

Call your provider or go to the emergency department if you have any of the following:

- Heavy bleeding, such as soaking a maxi pad in an hour or less for 2 or more hours.
- Pelvic pain or severe pain in your abdomen
- Fever over 100 degrees F (38 degrees C)
- Foul-smelling discharge

This handout is for informational purposes only. Talk to your healthcare provider if you have any questions about your care.

For more health information, go to wexnermedical.osu.edu/patiented or contact the Library for Health Information at 614-293-3707 or health-info@osu.edu.